

PUNTOS IMPORTANTES

- ▶ **El aborto por correo** es una peligrosa práctica que evita la adecuada atención médica en beneficio de incremento de los ingresos. En un aborto por correo no existe relación médico-paciente.
- ▶ **Los médicos** deben examinar a fondo a la mujer -no mirarla por webcam, para determinar lo avanzado de su embarazo y descartar la posibilidad de un embarazo ectópico, que es potencialmente mortal.
- ▶ **El seguimiento médico** es imprescindible en caso de complicaciones graves o fatales. Con los abortos por correo, el médico puede estar a cientos de kilómetros de la de la mujer.
- ▶ **La FDA** ha dado a la pastilla abortiva una etiqueta especial debido al riesgo de efectos secundarios. Los proveedores de abortos que hacen abortos por correo están poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
- ▶ **Complicaciones** de la pastilla abortiva deben ser reportadas a la FDA para que se recopilen datos precisos. Las pacientes pueden informar en línea en www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/ o llamando al 1-800-FDA-1088.

LA PASTILLA ABORTIVA EN MICHIGAN

Durante seis años, los abortos por telemedicina estuvieron prohibidos en el estado de Michigan. A finales de 2018, la prohibición iba a expirar. La legislatura de Michigan aprobó un proyecto de ley para ampliar la prohibición indefinidamente, pero en sus últimos días en el cargo, el gobernador Rick Snyder prohibió el proyecto de ley.

En Michigan, las mujeres tuvieron 15.333 abortos químicos abortos con la pastilla abortiva en 2020, lo que representa el 52% de todos los abortos en el estado.⁵ Las cifras de abortos con pastillas siguen aumentando porque son una medida que ahorra tiempo y costos a los centros abortistas.

REFERENCIAS

- 1 Guía del medicamento Mifeprex, U.S. Food and Drug Administration, consultada el 28 de diciembre de 2021, <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm>
- 2 Ben Johnson, "El Tribunal Supremo permite a los abortistas violar las normas de la FDA al usar RU-486", LifeSiteNews.com, 15 de diciembre de 2014, <https://www.lifesitenews.com/news/supreme-court-allows-abortionists-to-violate-fda-guidelines-when-using-ru-4/>
- 3 Carole Novielli, "Increasing Number of Abortion Pill Expansion Schemes Flout FDA Safety Regulations," Live Action News, 7 de noviembre de 2021, <https://www.liveaction.org/news/increasing-abortion-pill-expansion-flout-fda/>
- 4 Guía del medicamento Mifeprex, U.S. Food and Drug Administration, consultada el 28 de diciembre de 2021, <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm>
- 5 Mei You, Lindsey Myers y Glenn Radford, "Abortos inducidos en Michigan", Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, junio de 2021.

Updated 6/6/2022

Right to Life of Michigan Educational Fund
P.O. Box 901 · 2340 Porter St. SW, Grand Rapids, MI 49509-0901
(616) 532-2300 · info@rtl.org · [RTL.org](http://rtl.org)

LOS PELIGROS DEL ABORTO POR CORREO



NO ES DEMASIADO TARDE: REVERSIÓN DE LA PÍLDORA ABORTIVA

Si una mujer ha tomado la primera pastilla abortiva, pero no la segunda, existe la posibilidad de “revertir” el aborto y salvar al bebé. La progesterona, una hormona prescrita para evitar abortos, puede contrarrestar los efectos del primer fármaco.

Para obtener más información y encontrar un que pueda ayudarle, llame al **(877) 558-0333** o visite **abortionpillreversal.com**.

¿CÓMO FUNCIONA EL ABORTO POR CORREO O TELEMEDICINA?

El médico mantiene una “consulta con la paciente” por teléfono o videollamada con la mujer que busca el aborto, que podría estar a cientos de kilómetros de distancia. Sin examen físico, las píldoras abortivas se envían a las mujeres por correo, de forma potencialmente insegura y dejada en su porche o en su buzón. Una vez que la mujer ha tomado los medicamentos, no recibe ningún seguimiento directo por parte del médico.

“¿Iría usted a una consulta médica donde no quisieran que nunca conozcas a tu médico?”

Esta práctica es lucrativa para los proveedores del aborto. El costo promedio de un aborto químico es de entre 300 y 500 dólares. Este método fue desarrollado por Planned Parenthood como una medida de ahorro: en lugar de que los médicos estén físicamente

para examinar a la mujer en cada uno de sus centros de aborto, un médico puede encargarse de varios centros en un solo día.

¿CÓMO FUNCIONA LA PASTILLA ABORTIVA?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprobó el medicamento abortivo RU486 (marca comercial Mifeprex, también llamado mifepristone) El fármaco se vendió como una forma segura y privada para que la mujer abortara si estaba embarazada de 7 semanas o menos. La FDA amplió el uso de la píldora abortiva hasta las 10 semanas de gestación en 2016.

El procedimiento de aborto médico incluye dos píldoras. La dosis inicial de RU-486 bloquea la hormona del embarazo progesterona, privando al feto de nutrientes y debilitando la conexión entre el bebé y su madre.

Un segundo fármaco, el misoprostol (un medicamento para las úlceras), se toma entre 24 y 48 horas después en casa y provoca contracciones uterinas y expulsión del bebé muerto.¹

ADVERTENCIAS DE LA FDA

Cuando la FDA aprobó el medicamento, se estableció una REMS (Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos) Hay 62 medicamentos con efectos secundarios que requieren una REMS y el RU-486 es uno de ellos.

Durante años, los centros abortistas han violado las normas iniciales de la FDA recetando RU-486 a mujeres con más de 7 semanas de gestación² y utilizando procedimientos de telemedicina para violar el requerimiento de distribución en persona.³

LA PASTILLA ABORTIVA PUEDE SER PELIGROSA

Una revisión de los datos de la FDA⁴ muestra que el 85% de las mujeres reportaron de al menos una o más de las siguientes reacciones adversas tras tomar la píldora abortiva:

- hemorragias
- náuseas
- debilidad
- fiebre/escalofríos
- vómitos
- dolor de cabeza
- diarrea
- mareos

Las mujeres sangraron/se mancharon durante un promedio de 9 a 16 días. Entre el 2% y el 7% de los abortos fracasaron, por lo que las mujeres necesitaron abortos quirúrgicos de seguimiento.

La FDA ha recibido informes de la muerte de 26 mujeres asociadas con RU-486.

Los embarazos ectópicos no diagnosticados son particularmente peligrosos; los efectos secundarios de la píldora abortiva son similares a los síntomas de un embarazo ectópico potencialmente mortal. Los embarazos ectópicos no pueden diagnosticarse por videochat.

